TGI, VPH y climaterio

Prof. Adjunto Dr. O. Rosato
IIº Cátedra de Clínica Ginecológica
Universidad Nacional de Córdoba

Prevalencia de VPH en la menopausia

- **En la mujer climatérica es de 34%, de las cuales 24% poseen tipos de alto riesgo oncogénico .**
- **VPH 16 se encontró en el 72% de los casos y VPH 31 en el 16%**

HPV-DNA age-specific prevalence among women with normal cytology by region

HPV

<i>Condiloma acuminado</i>	83,3 %
Distrofias con hiperplasia	9,1 %
Hiperplasia con atipia	64,3 %
<i>Papulosis Bowenoide</i>	100 %
Ca. In Situ	57,1 %
<i>Ca. Invasor</i>	100 %
Liquen Escleroso	0 %

- **Los HPV de bajo riesgo raramente se asocian a patologías malignas, pero pueden participar en el desarrollo de lesiones precursoras CIN 2-3, tumores de cuello uterino, anales, vulvares y de pene asociadas a coinfecciones con múltiples tipos virales de alto riesgo.**

Verrugas genitales

- **Neoformaciones exofíticas.**
- **Blancas, rosadas, grises.**
- **Varían en tamaño, extensión, ubicación y en número.**
- **90% en relación al HPV 6-11**
- **30-50% pueden coexistir con virus de alto riesgo**

Garland y cols

- **Nº 8800 → 520 verrugas genitales**

Garland SM, et al. Natural history of genital warts: analysis of the placebo arm of 2 randomized phase II trials of a quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) vaccine. *J Infect Dis* 2009; 199(6):805-14.

Motivo de consulta

- **Presencia de flujo**
- **Prurito**
- **Olor**
- **Infecciones**

- ***"Se ven y se palpan"***

Quint W, et al. J Pathol 2012; 227:62-71.

Kaer SK, et al. J Infect Dis 2007; 196(10):1447-54.

Patel H, et al. BMC Infect Dis 2013; 13:39-46.

Desarrollo más notorio en:

- **Inmunocomprometidas**
- **Diabéticas**
- **Tratamiento con corticoides**
- **HIV**
- ***A veces son tan grandes y confluentes que no se distingue la anatomía.***

Quint W, et al. J Pathol 2012; 227:62-71.

Kaer SK, et al. J Infect Dis 2007; 196(10):1447-54.

Patel H, et al. BMC Infect Dis 2013; 13:39-46.

TGI, VPH y Climaterio

Condilomas virales

TGI, VPH y Climaterio

Rosato O, Minetti MdelC. Colposcopia de bolsillo. 2016.

Tratamiento

- **Destructivos:**
 - Podofilina
 - Podofilotoxina
 - Ácido bi-tri-cloroacético
- **Antiproliferativos:**
 - Retinoides
- **Inmunomoduladores:**
 - Interferón
 - Imiquimod
- **Quirúrgico:**
 - Radiofrecuencia
 - Criocirugía
 - Láser
 - Bisturí

Quint W, et al. J Pathol 2012; 227:62-71.

Kaer SK, et al. J Infect Dis 2007; 196(10):1447-54.

Patel H, et al. BMC Infect Dis 2013; 13:39-46.

Imiquimod

- **La reducción del tamaño de la lesión fue clasificada como:**
 - **Respuesta completa (eliminación)**
 - **Respuesta fuerte parcial (76% al 99% de reducción)**
 - **Respuesta débil parcial (26% a 75% de reducción)**
 - **Sin Respuesta ($\leq 25\%$ de reducción).**
- **En un período de seguimiento de 12 meses.**

HPV y verrugas genitales (condilomas acuminados)

- **Tratamiento aprobado por la FDA:**
 - Té Verde contiene CATEQUINA forma de administración 0,5 mg 3 veces por día hasta la resolución con un máximo de 16 semanas.
 - **Resultados:**
 - Desaparición → 55%
 - Disminución → 78%
- **Tratamientos con tasa de desaparición muy bajos:**
 - *Interferón intraluminal, 5-Fluorouracilo, Cidofovir, Isotretionoína.*

Neoplasia intraepitelial anal (AIN)

- **Las lesiones intraepiteliales anales forman parte de las infecciones multicéntricas del TGI producidas por el VPH.**
- **Se consideran potencialmente malignas y pueden progresar a carcinoma anal. El 87% relacionadas al HPV 16 y el 7% al HPV 18.**

Cáncer anal

- **2,6%** de los tumores colorrectales.
- **En EEUU, 1,8/100.000 mujeres.**
- **31/100.000 relacionado H+H.**
- **75/100.000 con VIH(+).**

- ***En inmunosuprimidas con antec. de VIN/CIN → hasta el 5%.***

Schofield JH, et al. *Colorectal Dis* 2011; 13(supl 1):3-10.

CDC. *MMWR* 2012; 61(15):258-261.

Palefsky JM. *J Infect Dis* 2001; 183(3):383-91.

Santoso JT, et al. *Obstet Gynecol* 2010; 116(3):578-82.

VIN II y PEIN III

Grupos de Riesgo

- **HIV (+).**
- **Trasplantadas → inmunodepresión.**
- **Lupus, Enf. Crohn.**
- **Pacientes con VIN, VAIN, CIN, Ca TGI.**
- **Sanas sin factores de riesgo.**

Schofield JH, et al. Colorectal Dis 2011; 13(supl 1):3-10.

CDC. MMWR 2012; 61(15):258-261.

Palefsky JM. J Infect Dis 2001; 183(3):383-91.

Santoso JT, et al. Obstet Gynecol 2010; 116(3):578-82.

Cáncer anal

- **La coexistencia con lesiones CIN, VIN, VAIN:**
 - **Scholfield y cols** → **19%**
 - **Santoso y cols** → **12,2%**
- **HNC BsAs, n:481 con lesiones de cuello uterino:**
 - **Las pacientes con VIH tuvieron más lesiones VIN/AIN que las inmunosuprimidas por otras causas.**

Schofield JH, et al. Colorectal Dis 2011; 13(supl 1):3-10.

Santoso JT, et al. Obstet Gynecol 2010; 116(3):578-82.

VAIN

- **Epidemiología: 0,2-2/100.000 mujeres**
- **Mayor prevalencia en:**
 - **Infección persistente con HPV**
 - **Inmunosupresión**
 - **Radioterapia previa**
 - **Tabaquismo**
 - **Otras neoplasias del TGI**
 - **50-60 años**

VAIN

- **DIAGNÓSTICO:**

- **Colposcopía:** lesiones acetoblancas, mosaicos, vasos atípicos, etc.
- **Citología**
- **Biopsia**
- **Ubicación:**
 - **1/3 superior** → **VAIN III**
 - **1/3 inferior** → **VAIN I**
- **Dificultades:** propias de la vagina (obesidad, pliegues, multíparas), embarazo, infecciones, atrofas, etc.

VAIN

- **TRATAMIENTO:**

- **VAIN III:**

- Escisiones locales (bisturí, LEEP, etc)
- Vaporización con láser
- Colpectomía
- 5-FU

- **VAIN I:**

- Ácido tricloroacético y control

- *Previamente es aconsejable utilizar estriol.*

TGI, VPH y Climaterio

VAIN

VAIN

VAIN

1) Descripción colposcópica:

- a) Puntillado grueso en pared posterior de vagina.**
- b) Condiloma viral.**
- c) Colpitis por atrofia.**
- d) Carcinoma invasor de vagina.**

2) Diagnóstico citohistológico

VAIN

1) Descripción colposcópica:

- a) Puntillado grueso en pared posterior de vagina.**
- b) Condiloma viral.**
- c) Colpitis por atrofia.**
- d) Carcinoma invasor de vagina.**

2) Diagnóstico citohistológico

VAIN

1) Descripción colposcópica:

- a) Puntillado grueso en pared posterior de vagina.**
- b) Condiloma viral.**
- c) Colpitis por atrofia.**
- d) Carcinoma invasor de vagina.**

2) Diagnóstico citohistológico

→ VAIN 2

VAIN

3) Alternativas terapéuticas:

- a) Control semestral.**
- b) Vaginectomía.**
- c) Resección con asa radiofrecuencia.**
- d) Laser.**
- e) c y d son correctas.**

VAIN

3) Alternativas terapéuticas:

- a) Control semestral.**
- b) Vaginectomía.**
- c) Resección con asa radiofrecuencia.**
- d) Laser.**
- e) c y d son correctas.**

VAIN

Cáncer de Vagina

Cambios fisiológicos del cuello uterino

- **Disminuyen los estrógenos → atrofia → aplanamiento.**
- **Estenosis del conducto cervical.**
- **Desplazamiento del límite escamocolumnar (entropión).**
- **Reemplazo del TC por colágeno.**
- **Pérdida del estrato intermedio y superficial.**

Aspectos colposcópicos

- **Mucosa rosada pálida.**
- **Fragilidad capilar.**
- **Petequias subepiteliales.**
- **Ácido acético: poco efectivo.**
- **Yodo: color amarillento, moteado.**
- **Epitelio columnar, cuando es visible
→ bajo y atrófico.**

CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL EN LA MENOPAUSIA

- **No se recomienda una edad límite para el screening del Cáncer de Cuello. Mientras la mujer sea sana deberá realizar un control regular.**

- Según la Academia Internacional de Citología, los extendidos en la menopausia pueden ser:
 - **Estrogénicos:** cuando hay presencia de células superficiales.
 - **Progesterogénicos:** presencia de células de estrato intermedio.
 - **Atróficos:** predominan las células paravasales.

TGI, VPH y Climaterio

TGI, VPH y Climaterio

TGI, VPH y Climaterio

TGI, VPH y Climaterio

TGI, VPH y Climaterio

FCM
Facultad de
Ciencias
Médicas

140 AÑOS
1877 - 2017

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Reforma
1918 - 2018

2017 - "Año de las Energías Renovables"

Jornadas Internacionales de Actualización en Tracto Genital Inferior y Colposcopia

Organizadas por:

**Capítulos de Tracto Genital Inferior y Adolescencia de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba**

**Federación Latinoamericana de Tracto Genital Inferior y Colposcopia
II Cátedra de Ginecología F.C.M. - U.N.C.**

22 y 23 de Junio 2017

Sede: Aula Magna

Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología

Muchas gracias